

Consigli colturali e difesa



Olivo

Fase fenologica: 2^ Fase accrescimento dei frutti

Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae): Il monitoraggio in campo evidenzia una stabilità delle catture nelle trappole. Il controllo sulle drupe, dove queste non patiscono stress idrico, evidenzia che si al limite della soglia di intervento sulle varietà pizze carroga, tonda di cagliari, semidana. E' da preferire ad un trattamento chimico, una raccolta anticipata delle olive al primo manifestarsi dell'invaiaura, solo se si prevede una raccolta più tardiva effettuare un trattamento con dimetoato, fosmet, alle dosi indicate in etichetta. Non trattare dove le drupe patiscono forte stress idrico e sono poco ricettive agli attacchi della mosca.



Vite

Fase fenologica: Maturazione - Grappoli maturi

Mal dell'esca (vari funghi tra cui Fomitiporia mediterranea, Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum): Provvedere a segnare prima possibile i ceppi infetti in modo da identificarli facilmente (anche dopo la caduta delle foglie) e provvedere all'estirpamento, e alla distruzione per abbruciamento di tutto il materiale. Non prelevare materiale di propagazione dai ceppi infetti, dedicare alle lavorazioni sui ceppi predetti, un kit di attrezzi di lavoro separato.

NOTE: Prima della raccolta, rispettare scrupolosamente il periodo di carenza indicato sull'etichetta del prodotto utilizzato. Si ricorda inoltre, di tenere sempre aggiornato il registro dei trattamenti.